

Указания за употреба

Перорален гел с миконазол (като Дактарин орал гел)

За приложение в устната кухина, след хранене. Гелът е лепкав — прилагайте внимателно заради риск от задавяне. Да се пази от деца.

Колко често се прилага?

Според официалната информация пероралният гел с миконазол се прилага след хранене, върху чиста лигавица:

3–4 пъти дневно след хранене

Точното количество и продължителност се определят от лекаря и са посочени на етикета на приготвената форма.

Как се прилага?

- Прилагайте след хранене.
- Не гълтайте гела веднага — задръжте го в устата възможно най-дълго и при възможност го разпределете върху засегнатите участъци.
- Гелът е лепкав; прилагайте внимателно, за да се избегне задавяне (особено при затруднено преглъщане).
- Не започвайте друго лечение в устата, без да се консултирате с лекар или фармацевт.

Носите зъбни протези?

При гъбична инфекция на устата сваляте зъбните протези през нощта и ги почиствайте с гела. Това помага да се предотврати повторно разпространение на инфекцията.

Колко дълго продължава лечението?

Продължете лечението поне още една седмица след изчезване на оплакванията, освен ако лекарят не определи друго:

минимум 1 седмица след отзвучаване на симптомите

Важно преди и по време на употреба

Преди употреба кажете на лекаря или фармацевта и спазвайте следното:

- не използвайте при чернодробно заболяване (нарушена чернодробна функция);
- не използвайте при алергия към миконазол или други имидазолови противогъбични лекарства;
- ако сте бременна, кърмите или планирате бременност — посъветвайте се с лекар или

фармацевт преди употреба;

- кажете за всички лекарства, които приемате — миконазол може да взаимодейства с лекарства за разреждане на кръвта (варфарин), някои статини (симвастатин, ловастатин), лекарства за алергия и за сърдечния ритъм и други.

Кога да спрете употребата?

Спрете употребата и потърсете незабавно лекар при:

- подуване на лицето, езика или гърлото;
- затруднено преглъщане или дишане;
- обрив, копривна треска или други признаци на алергична реакция;
- тежка кожна реакция — мехури или белене на кожата;
- пожълтяване на кожата или очите, силна умора (възможно засягане на черния дроб).

Съхранение

Съхранявайте в хладилник (2–4 °C), на място, недостъпно за деца. Не прехвърляйте формата в друга опаковка и спазвайте срока и указанията на етикета.

3–4 пъти дневно след хранене, върху чиста лигавица; задръжте в устата; продължете поне 1 седмица след отзвучаване на симптомите.



Пълната статия онлайн

Сканирайте кода, за да отворите статията на Extempore.bg с повече информация.

Формата е приготвена индивидуално в аптека Линк. Тези указания са обща информация по официалната листовка на Дактарин (миконазол) перорален гел и допълват, но не заменят указанията на Вашия лекар или фармацевт и етикета на приготвената форма.

аптека Линк · гр. Бургас, ул. Оборище 94 · тел. 0896 845 535 (Viber/WhatsApp) · 056/811 174 · Актуализирано: 25 юни 2026 г.