

Указания за употреба

Форма с флуороурацил и салицилова киселина за брадавици (като Verrumal / Верутол)

Само за външна употреба и само върху брадавицата. Да не се поглъща. Да се пази от деца.

Колко често се прилага?

Според официалната продуктова информация съставът се нанася върху всяка брадавица:

2–3 пъти дневно

Прилага се само върху брадавицата, без разтичане върху здравата кожа.

Как се прилага?

- Мястото се измива и подсушава добре.
- При нужда здравата кожа около брадавицата се защитава с тънък слой паста или вазелин.
- С апликатор или клечка се нанася малко количество само върху брадавицата.
- Да не се допуска разтичане върху здравата кожа.
- Остава се да изсъхне и да образува тънък филм.
- Преди всяко ново нанасяне засъхналият филм се отстранява чрез внимателно обелване.

Колко дълго продължава лечението?

Средната продължителност на лечението според официалната информация е:

около 6 седмици

Често лечението се продължава още около седмица след видимото изчистване на брадавицата, освен ако лекарят не определи друго.

Важни ограничения

Съставът не е предназначен за големи участъци кожа. Спазвайте следните ограничения:

- не се третира голяма площ наведнъж — общата третирана площ остава малка;
- не се нанася върху лицето, половите органи и лигавиците, нито в носа и устата;
- не се нанася върху бенки, рождени петна, окосмени или кървящи брадавици;
- не се нанася върху възпалена, наранена или раздразнена кожа.

Важно преди и по време на употреба

Флуороурацилът се отпуска по лекарско предписание. Преди употреба кажете на лекаря или

фармацевта и спазвайте следното:

- ако сте бременна, мислите, че може да сте бременна, планирате бременност или кърмите — не използвайте състав с флуороурацил;
- ако имате бъбречно заболяване, диабет или нарушено кръвообращение;
- ако наскоро сте били лекувани с бривудин или соривудин (противовирусни при херпес зостер);
- съставът не се прилага при бебета; при деца употребата е по преценка на лекар;
- избягвайте контакт с очите; при попадане в очите изплакнете обилно с вода.

Кога да спрете употребата?

Спрете употребата и потърсете лекар/фармацевт при:

- силно парене или силна болка;
- рана, мехур, язва или кръвене;
- силно зачервяване или подуване;
- разпространяващо се възпаление към здравата кожа;
- признаци на алергична реакция (обрив, сърбеж, подуване);
- други необичайни симптоми, които Ви тревожат.

2–3 пъти дневно, само върху брадавицата, с премахване на стария филм преди всяко ново нанасяне; средно около 6 седмици.



Пълната статия онлайн

Сканирайте кода, за да отворите статията на Extempore.bg с повече информация.

Формата е приготвена индивидуално по Ваша рецепта в аптека Линк. Тези указания са обща информация по официалната продуктова информация за Verrumal / Верутол (флуороурацил и салицилова киселина) и допълват, но не заменят указанията на Вашия лекар или фармацевт и етикета на приготвената форма.

аптека Линк · гр. Бургас, ул. Оборище 94 · тел. 0896 845 535 (Viber/WhatsApp) · 056/811 174 · Актуализирано: 26 юни 2026 г.